ナス病害虫防除基準

病害虫名	防除時期	薬剤名	成分数	使用濃度	10ａ当り使用量	使用時期（収穫何日前まで）	使用回数
アブラムシ類	定植時	アクタラ粒５	1	1ｇ/株	－	定植時	1
	生育中	ハチハチ乳	1	1000～2000倍	100～300リットル	前日	2
ハダニ類	生育中	ピラニカＥＷ	1	2000～3000倍	150～300リットル	前日	1
	生育中	コテツフロアブル	1	2000倍	100～300リットル	前日	4
チャノホコリダニ	生育中	モレスタン水	1	2000倍		前日	3
アザミウマ類	生育中	アルバリン顆粒水	1	2000倍		前日	2
オオタバコガ	生育中	アファーム乳	1	2000倍		前日	2
	生育中	マッチ乳	1	2000倍		前日	4
	生育中	デルフィン顆粒水（BT剤）	－	1000倍		前日	－
ハスモンヨトウ	生育中	マトリックフロアブル	1	2000倍		前日	3
カメムシ類	生育中	マラソン粉３	1	－	３ｋｇ	前日	6
灰色カビ病	生育中	セイビアーフロアブル20	1	1000～1500倍	100～300リットル	前日	3
	生育中	カンタスドライフロアブル	1	1000～1500倍		前日	3
うどんこ病	生育中	ベルクート水	1	3000倍	150～300リットル	前日	3
	生育中	モレスタン水	1	2000倍	100～300リットル	前日	3
褐色腐敗病	生育中	ランマンフロアブル	1	2000倍	150～300リットル	前日	4
青枯病	生育中	バリダシン液剤５	1	500倍	150～300リットル	前日	8

ナス病害虫基幹防除体系（エコファーマー）



使用殺虫剤　11種類（内１種類BT剤）　エコ栽培農産物農薬散布回数
使用殺菌剤　６種類　２５回以内