

水稻栽培ごよみ (ハナエチゼン・五百万石・コシヒカリ)

平成24年 JAテラル越前

月 旬	3月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月																																				
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																																		
生育経過		育苗期			活着期			有効分けつ期			最高分けつ期			幼穂形成期			出穂期			傾穂期			登熟期			成熟期																														
管理作業	ハナエチゼン 五百万石 コシヒカリ	圃場準備 育苗準備			播種	育苗	苗立枯防除	田植	除草剤散布	溝切り	中干し	葉いもち	予防剤施用	中間肥	穂肥1 穂肥2	穂肥1 穂肥2	穂肥1 穂肥2	紋枯病防除	一斉防除1	多発カメムシ防除	一斉防除2	収穫・乾燥・調整			収穫・乾燥・調整			土づくり 排水溝の設置																												
作業実施日 (農家記入)	ハナエチゼン 五百万石 コシヒカリ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																									
水管理	除草剤の効果・後期水管理のため圃場は均平にする		浅水管理						中干し			間断通水						落水は刈取の5日前 但し、乳白・腹白米防止のため 刈取まで土の湿り気を保つ																																						
栽培管理のポイント	今年の営農計画を立てましょう		種子消毒は必ず行う 深耕する(目標5cm) 根張りを良くするため			(老化苗防止) 田植日を想定し播種日決める			充実した苗づくり 薄播きで			温度管理水管理に注意する 徒長苗防止のため			葉いもち予防剤の施用 の補給(中間肥) 土壌に応じたケイ酸・りん酸 ハナエチゼンの追肥 中干しで根腐れ防止			溝切りを必ず行う 後期水管理のため 湧きが見えたら田干しをする 活着後は浅水管理で			除草剤の適期散布			イナゴの防除			1回目穂肥の適期施用 (倒伏防止)			2回目穂肥の適量施用 (登熟期養分補給)			紋枯病防除 (農道畦畔の草刈り実施) カメムシ防除対策			1回目一斉防除(穂揃期)			2回目一斉防除(傾穂期)			(乳白・胴割米防止) 間断通水の励行			刈取直前まで土は湿らせておく			適期刈取をする (青未熟・胴割米防止)			(胴割米防止) 高温急激乾燥をしない			額縁溝等による排水対策		

肥料名	元 肥								中間肥		種肥1回目		種肥2回目	
	テラルの もとさん	IB050	エムコート 早生045	ハイコート 早生024	コシ名人 乾田 湿田	セラコート 024	リンマク マクホス	腐植りん 珪酸カリ	福井有機50 テラルの おいさん	福井有機50 テラルの おいさん				
一般施肥	ハナエチゼン	全層 25~30 上層 20						30~40		15~20	10~15			
	五百万石	全層 20~25 上層 20								15~20	10			
	コシヒカリ	全層 20~25 上層 20								15	10			
側条施肥	ハナエチゼン	40~45	40~45					30~40		15~20	10~15			
	五百万石	40	40							15~20	10			
	コシヒカリ	35~40	35~40							15	10			
一括肥料	ハナエチゼン		40~45	40				30~40						
	五百万石		40 (乾田)	40 (湿田)										
	コシヒカリ				30	25	35							

病害虫名	農薬名	防除時期
苗立枯病	モミガードC水和剤	種子消毒(浸漬前)
	タチガレエース粉	播種前床土混和
	ダコニール1000液	播種時
イネミズブウムシ イネゾウムシ イネドロオイムシ	パダン粒	育苗期間中
	シクロパック	5月下旬~6月
	パダン粉DL	(害虫発生時)
葉いもち	ジャツジ粒	移植3日前~当日 (箱施用)
	オリゼメート1キロ粒	6月上旬(予防)
	カスラブサイド粉DL	発生初期(治療)
	ブラシン粉DL	発生初期(治療)
イナゴ	イモチエース粒	6月中旬(予防)
		発生初期(治療)
紋枯病	アルバリン粉DL	6月下旬~7月上旬
一斉防除	1回目 カメムシ	穂揃期
	2回目 多発地帯	傾穂期

除草剤	田植	5日	10日	15日	20日	25日	6月上旬	
タイプ1 (ビエ・ホタレイ・1年雑草)	ソルネット	(移植直後~5日以内)					マメットS M	(移植後20日~30日以内)
タイプ2 (田植同時可能一発処理)	マーシエット						フルチャーシジャンボ	(移植後7日~収穫45日前まで)
タイプ3 (一発処理)	トノニ	(移植直後~30日以内)						
	バチオ	(移植直後~30日以内)						
タイプ4 (雑草)	トレデ	(移植後5日~30日以内)						
	ラセ	(移植後5日~30日以内)						
	ツシ	(移植後5日~30日以内)						
	フシ	(移植後5日~30日以内)						
	スマ	(移植直後~30日以内)						
	ラク	(移植後3日~30日以内)						
	ヒエ	(移植後15日~収穫45日前まで)						
	ビエ	(移植後15日~収穫60日前まで)						
	雑草	(移植後15日~収穫60日前まで)						
	雑草	(移植後15日~収穫60日前まで)						

赤字は、劇毒物