

水稲用農薬、除草剤安全使用(防除)基準

用途	薬剤名	成分数	防除時期	使用量	使用時期	使用回数
				濃度、10a 当り	(収穫何日前まで)	(何回以内)
種子消毒	モミガードC水	3	浸種前種子粉衣	乾燥種初重の0.5%	浸種前	1
床土消毒	タチガレエース粉	2	播種前土壌混和	1箱当り6~8g混和	播種前	1
苗立枯予防	ダコニール 1000	1	播種時	500~1000倍0.5% / 1箱	播種時	1
苗立枯予防	タチガレエース液	2	播種時 発芽後	500~1000倍0.5% / 1箱	播種時又は発芽後	1
初期害虫	バダン粒	1	移植当日	50~100g / 1箱	移植当日	1
害虫いもち予防	ジャッジ箱粒	2	移植前3日~移植当日	50g / 1箱	移植前3日~移植当日	1
害虫本田防除	シクロパック	1	5月下旬~6月上旬	60g × 10パック	60	4
害虫本田防除	バダン粉DL	1	6月上旬~7月	3~4kg	21	6
いもち病予防	オリゼメート1キロ粒	1	6月上旬	1kg	出穂3~4週間前(14)	2
いもち病予防	イモチエース粒	1	葉いもち初発時	3kg	35	1
いもち病防除	カスラブサイド粉DL	2	6月下旬~8月上旬	3~4kg	穂揃い期まで	2
いもち病防除	ブラシン粉DL	2	6月下旬~8月上旬	3~4kg	21	2
イナゴ防除	アルバリン粉DL	1	6月下旬~7月上旬	3kg	7	3
紋枯病防除	モンカト7インチ粉20DL	1	7月	3~4kg	14	3
一斉防除	トップジンスタークル粉DL	2	穂揃期	3~4kg	14	3
一斉防除	ビームクラップジョーカー粉DL	3	傾穂期	3~4kg	14	2
一斉防除	サジェスト 微粒剤 F	3	穂揃期	3~4kg	21	3
一斉防除	ビームスタークル 微粒剤 F	2	傾穂期	3~4kg	7	3
いもち病、紋枯病、カメ虫類防除	嵐クラップ粒	2	出穂5~10日前	3kg	21	1
カメ虫防除	アルバリン粉DL	1	出穂期~乳熟期	3kg	7	3
カメ虫防除	アルバリン粒	1	穂揃期	3kg	7	3
初期除草剤	ソルネット1和粒	1	移植直後~30日以内	1kg		1
初期除草剤	マーシェット1和粒	1	移植直後~30日以内	1kg		1
中期除草剤	マメットSM1和粒	3	移植後20~30日	1kg		1
中期除草剤	フルチャージジャンボ	2	移植後7~収穫45日前	50g × 10パック	45	1
中期除草剤	バサグラン粒	1	移植後15~50日	3~4kg	60	1
中期除草剤	ヒエクリーン1和粒	1	移植後15~収穫45日前	1kg	45	1
中期除草剤	ヒエクリーンバサグラン粒	2	移植後15~収穫60日前	3kg	60	1
初中期一発除草剤 [田植同時処理可]	イノーバトリオ1和粒51	3	移植直後~30日以内	1kg		1
初中期一発除草剤 [田植同時処理可]	ドニテS1和粒	3	移植直後~30日以内	1kg		1
初中期一発除草剤	メガゼータ 1和粒	2	移植後5日~30日以内	1kg		1
初中期一発除草剤	トレディワイド1和粒	4	移植後5日~30日以内	1kg		1
初中期一発除草剤	ポッシブル1和粒	2	移植後5日~30日以内	1kg		1
初中期一発除草剤	ポッシブルジャンボ	2	移植後5日~30日以内	50g × 10パック		1
初中期一発除草剤	ポランティアジャンボ	3	移植後5日~30日以内	40g × 10パック		1
初中期一発除草剤	スマートフロアブル	3	移植直後~30日以内	500ml		1
初中期一発除草剤	ラクダープロLフロアブル	4	移植後3日~30日以内	500ml		1