

水稲用農薬、除草剤安全使用(防除)基準

用 途	薬 剤 名	成分数	防除時期	使用量	使用時期	使用回数
				濃度. 10a 当り	(収穫何日前まで)	(何回以内)
種 子 消 毒	モミガードC水	3	浸種前種子粉衣	乾燥種初重の0.5%	浸種前	1
床 土 消 毒	タチガレエース粉	2	播種前土壌混和	1箱当り6~8g混和	播種前	1
苗 立 枯 予 防	ダコレート水	2	播種時	400~600倍0.5% ¹ /1箱	播種時	1
苗 立 枯 予 防	タチガレエース液	2	播種時 発芽後	500~1000倍0.5% ¹ /1箱	播種時又は発芽後	1
初 期 害 虫	パダン粒	1	移植当日	50~100g/1箱	移植当日	1
害 虫 い も ち 予 防	ジャッジ箱粒	2	移植前3日~移植当日	50g/1箱	移植前3日~移植当日	1
害 虫 本 田 防 除	シクロパック	1	5月下旬~6月上旬	60g×10パック	60	4
害 虫 本 田 防 除	パダン粉DL	1	6月上旬~7月	3~4kg	21	6
い も ち 病 予 防	オリゼメート1キロ粒	1	6月上旬	1kg	出穂3~4週間前(14)	2
い も ち 病 予 防	イモチエース粒	1	葉いもち初発時	3kg	35	1
い も ち 病 防 除	カスラブサイド粉DL	2	6月下旬~8月上旬	3~4kg	14	5 (穂ばらみ期以降)
い も ち 病 防 除	ブラシン粉DL	2	6月下旬~8月上旬	3~4kg	21	2
イ ナ ゴ 防 除	アルバリン粉DL	1	6月下旬~7月上旬	3kg	7	3
紋 枯 病 防 除	モンカトファイブ粉20DL	1	7月	3~4kg	14	3
一 斉 防 除	カスエルバッサ粉DL	3	穂揃期	3~4kg	穂揃期	2
一 斉 防 除	ビームクラブジョーカー粉DL	3	傾穂期	3~4kg	14	2
いもち病、紋枯病、カメ虫類防除	嵐クラブ粒	2	出穂5~10日前	3kg	21	1
カ メ 虫 防 除	アルバリン粉DL	1	出穂期~乳熟期	3kg	7	3
カ メ 虫 防 除	アルバリン粒	1	穂揃期	3kg	7	3
初 期 除 草 剤	ソルネット1和粒	1	移植直後~5日	1kg		1
初 期 除 草 剤	マーシェット1和粒	1	移植直後~5日	1kg		1
中 期 除 草 剤	マメットSM1和粒	3	移植後20~30日	1kg		1
中 期 除 草 剤	バサグラン粒	1	移植後15~50日	3~4kg	60	1
中 期 除 草 剤	ヒエクリーン1和粒	1	移植後15~35日	1kg	45	1
中 期 除 草 剤	ヒエクリーンバサグラン粒	2	移植後15~35日	3kg	60	1
初中期一発除草剤 [田植同時処理可]	イノーバDXアップ1和粒51	4	移植同時~15日	1kg		1
初中期一発除草剤 [田植同時処理可]	ドニチS1和粒	3	移植同時~15日	1kg		1
初中期一発除草剤	トップガンGT1和粒51	4	移植後~15日	1kg		1
初中期一発除草剤	トレディワイド1和粒	4	移植後5日~15日	1kg		1
初中期一発除草剤	サスケラジカルジャンボ	4	移植後3日~12日	20g×10パック		1
初中期一発除草剤	ボランティアジャンボ	3	移植後5日~15日	40g×10パック		1
初中期一発除草剤	ラクダープロLフロアブル	4	移植後3日~15日	500ml		1