

一般・麦跡栽培 施肥基準

(kg/10 a)

区分	肥料名	黒ボク土	砂壤土	壤土	備考
土改材	堆肥	2,000	2,000	2,000	元肥施用の20日前に施用する。
	バーク炭	100	100	100	
	マグエース または マグフミン	200	160	160	
	ようりん (ホスピタ)	60 (80)	40 (60)	40 (60)	
元肥	「さとこ」を使用する場合				さとこ(里固)は固形30号と早効性の磷硝安の混合肥料です
	さとこ	200	200	180	
	「固形30号」を使用する場合				
	固形30号	160	160	60	
	そさい3号	50	50	100	
	「あさひ」を使用する場合				
	あさひ	120	120	100	
そ菜3号	30	30	35		
追肥	そ菜3号	(20)	(20)	(20)	追肥は生育が劣る場合に6月中旬までに施用すること。

前年秋黒マルチ栽培 施肥基準

(kg/10 a)

区分	肥料名	黒ボク土	砂壤土	壤土	備考
土改材	堆肥	2,000	2,000	2,000	元肥施用の20日前に施用する。
	バーク炭	100	100	100	
	石灰窒素	20	20	20	稲ワラの早期腐植を図る
	マグエース または マグフミン	200	160	160	
	ようりん	60	40	40	
元肥	さとこ	210	210	190	
追肥	そ菜3号	(20)	(20)	(20)	追肥は生育が劣る場合に6月中旬までに施用すること。

病害虫防除基準

病害虫名	防除時期	薬剤名	成分数	使用濃度	10a 当り 使用量	使用時期 (収穫前日数)	使用 回数
黒斑病	種芋消毒	トップジンM水	1	200～ 500 倍 30 分浸漬		植付前	1
アブラムシ類	植付時	アドマイヤー1 粒	1	—	4kg	植付時	1
	生育中	アディオン乳	1	3000 倍	100～200 リットル	7 日	5
ハダニ アブラムシ類	生育中	ニッソランV乳	2	1000 倍	100～200 リットル	7 日	2
カンザワハダニ ハスモンヨトウ	生育中	コテツフロアブル	1	2000 倍	100～300 リットル	7 日	2
ハスモンヨトウ	生育中	エルサン粉2	1	—	3 kg	7 日	1
		トレボン乳	1	1000 倍	100～200 リットル	14 日	3
		ハクサップ水	2	2000 倍	100～200 リットル	3 日	5
コガネムシ類幼虫	生育中	オンコル粒5	1	—	6～9kg	土寄時	1

* 使用回数は本剤及び本剤成分を含む農薬の総使用回数

黒斑病の芋



黒色の斑点 (カビ)

罹病芋が混入すると、出荷箱の中で蔓延し、
温度が25℃で多発する。

除草剤基準

使用時期	薬剤名	成分数	10 a 当たり 使用量	使用時期 (収穫前日数)	使用 回数	備考
定植時	トレファノサイト乳	1	300～400ml	植付後、但し 植付け 7 日 後まで	1	土壌表面散布
	トレファノサイト粒 2.5	1	4～6 kg			
定植後	バスタ液	1	300～500ml	30 日前	3	植付後 畝間処理
定植後	ブリグロックSL	2	600～1000ml	雑草生育期 ～収穫前日 まで	3	植付後 畝間処理

* 使用回数は本剤及び本剤成分を含む農薬の総使用回数